

## بررسی ارتباط چگونگی انتخاب رشته تحصصی و محل تحصیل با میزان اضطراب دستیاران پزشکی

فریبهر خوروش<sup>۱</sup>، سحر وصال<sup>۲\*</sup>، سید علی موسوی<sup>۱</sup>، غلامرضا قاسمی<sup>۳</sup>، نوشین مهرید<sup>۴</sup>

۱. متخصص داخلي اعصاب، داشتیار گروه داخلي اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ایران
۲. کارشناس امور پژوهشی، کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ایران.
۳. دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی(بهداشت و روان)، داشتیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ایران
۴. دستیار تخصصی داخلي اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ایران

● دریافت مقاله: ۹۰/۹/۱۳      ● آخرین اصلاح مقاله: ۹۰/۱۰/۲۵      ● پذیرش مقاله: ۹۰/۱۱/۱

زمینه و هدف: پژوهشکان عمومی که می‌خواهند در یک تخصص تحصیلات خود را ادامه دهند، دارای درگیری مختلفی در این زمینه هستند که عاملی برای ایجاد فشار و استرس در زندگی فردی آنها است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط چگونگی انتخاب رشته تحصصی و محل تحصیل با میزان اضطراب دستیاران پزشکی در سال ۱۳۸۹ بود.

رووش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی - مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش، دستیاران پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، گیلان، زاهدان، سمنان و کاشان بود (۳۷۰ نفر)، که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم در مطالعه شرکت داده شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودستجنبی اضطراب Zung جمع‌آوری شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بیش از ۹۲ درصد از دستیاران مورد مطالعه اضطراب نداشته، در گروه نرمال قرار گرفته‌اند. ۱۶۸ نفر (۴۵/۴ درصد) تنها به علت عوامل و علایق شخصی، ۵۵ نفر (۱۴/۹ درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و ۱۴۷ نفر (۳۹/۷۴ درصد) هر دو عامل درونی و بیرونی را در انتخاب خود مؤثر دانسته‌اند. ۲۲۰ نفر (۵۹/۵ درصد) دستیاران در ۳ شهر اول مورد علاقه خود درس می‌خوانند. ارتباط آماری معنی داری بین اضطراب با شهر مورد علاقه تحصیل و دانشگاه تحصیل مشاهده شد ( $P < 0.05$ ).

نتیجه‌گیری: علاقه و موفقیت هر چه بیشتر دستیاران در تحصیل، ثمره انتخاب درست ایشان، همچنین برنامه‌ریزی‌های مدیریتی برای از بین بردن موضع انتخاب رشته و شهر مورد علاقه از طرف مسئولان و برنامه‌ریزان بود.

کلید واژه‌ها: اضطراب، دستیاری پزشکی، انتخاب رشته، محل تحصیل.

\* نویسنده مسؤول: مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان، ایران.

## مقدمه

محل تحصیل دلخواه نیز به این اختلالات دامن می‌زند (۵). ارزیابی شیوع اضطراب در جامعه پزشکی در مراحل دانشجویی و بعد از آن و بررسی راهکارهای رفع یا کاهش آن از اولویت‌های حمایت از این جامعه است. به منظور بررسی اختلالات روانی در دانشجویان پزشکی مطالعات مختلفی انجام شده است (۶-۹).

مطالعه جدیدی به وسیله پژوهشگران دانشگاه بوسنون به منظور بررسی میزان اختلالات روانی در دستیاران پزشکی انجام شده است که نشان می‌دهد، استرس در طول دوران دستیاری بر عملکرد موفقیت و نیز تعداد خطاهای پزشکی دستیارهای پاتولوژی اثر قابل توجهی می‌گذارد (۱۰).

بررسی متون گوناگون در این زمینه نشان می‌دهد که اضطراب با عوامل مختلف فردی تحصیلی رابطه دارد و به طور طبیعی می‌توان از طریق بر طرف کردن موانع از اضطراب دانشجویان کاست. از طرف دیگر تاکنون مطالعه اختصاصی بر روی اختلالات روانی دستیاران پزشکی در ایران انجام نشده است، تا برای برنامه‌ریزان کشور نمونه‌ای ارایه دهد. از این‌رو، این مطالعه با هدف بررسی میزان اضطراب در دستیاران پزشکی و در همه گروه‌های تخصصی در سال ۱۳۸۹ انجام شد.

## روش کار

این مطالعه توصیفی- مقطوعی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. پژوهشگران مطالعه حاضر هر ۳ گروه تیپ دانشگاهی کشور را با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم در مطالعه شرکت دادند. جامعه آماری این پژوهش دستیاران پزشکی سال ۱ تا سال ۴ دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، گیلان، زاهدان، سنتوج و کاشان بودند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ای و از ۲ بخش تشکیل شده بود: اطلاعات دموگرافیک/ پرسش‌های مربوط به سنجش اضطراب. به منظور بررسی عوامل مؤثر در انتخاب رشته، اولویت انتخاب مکان و رشته تحصیلی پرسش‌هایی در

اضطراب و افسردگی رایج‌ترین اختلال روانی است. امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند، یکی از اقسام مهم جامعه به شمار می‌آیند. زیرا دانشجویان نه تنها بخش اصلی متخصصان زمینه‌های گوناگون علمی، فنی و هنری هر کشور را تشکیل می‌دهند، مدیران اصلی در اداره آینده کشور و رهبر سایر اقسام جامعه به سمت کمال و اهداف کشور می‌باشند. با توجه به تمام این مسائل و این که کشور ایران یک کشور جوان می‌باشد، اهمیت سلامت دانشجویان بیش از پیش مشخص می‌شود (۱، ۲).

برخی از محققان، اضطراب و افسردگی را در دانشجویان پزشکی بیشتر از دانشجویان رشته‌های دیگر می‌دانند (۳). در واقع در میان رشته‌های مختلف تحصیلی، پزشکی با توجه به طبیعت پراسترس و درگیری آن با درد و رنج انسان‌ها و شرایط خاص تحصیلی، انتخاب شغل و انتظاراتی که از جامعه دارند، دارای اضطراب بیشتری هستند (۴). با توجه به این که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشکی خود جزیی کوچک از جامعه می‌باشند، اما بروز و شیوع اختلالات روانی در آن‌ها تأثیری عظیم‌تر و گسترده‌تر در مقایسه با سایر جوامع حرفه‌ای و تخصصی دارد. باید پذیرفت که عوارض ناشی از عدم توجه و تمرکز پزشکان بسیار سنگین می‌باشد و بدیهی است که اضطراب احتمال خطأ و اشتباه حاصل از عدم توجه و تمرکز پزشکان را افزایش می‌دهد (۵).

علاوه بر مراحل استرس‌زای پزشکی عمومی، افرادی که می‌خواهند در یک تخصص تحصیلات خود را ادامه دهند، دارای درگیری مختلفی در این زمینه هستند، که خود می‌تواند عاملی برای ایجاد فشار و استرس در زندگی فردی آن‌ها باشد. دستیاران پزشکی در مرحله اول درگیر انتخاب رشته می‌شوند که مرحله‌ای پراسترس است و از طرفی در ادامه مانند همه دانشجویان، عدم علاقه به رشته تحصیلی می‌تواند عامل استرس و با گذشت زمان اضطراب در دستیارهای تخصص‌های گوناگون شود. در بسیاری از موانع عدم علاقه به

• 20-44 Normal range

• 45-59 Mild to moderate anxiety levels

• 60-74 Marked to severe anxiety levels

• 75-80 Extreme anxiety levels

برای اجرای پرسش نامه ها پس از کسب مجوز هماهنگی های لازم با دانشگاه های مورد پژوهش انجام گردید و با مشخص نمودن یک رابط از هر دانشگاه و ارایه آموزش های لازم در خصوص نحوه پرسشگری، مانند ارایه توضیحات لازم به دانشجویان درباره طرح پژوهشی، نحوه تکمیل پرسش نامه، محترمانه ماندن اطلاعات اخذ شده و جلب اعتماد و همکاری دانشجویان، پرسش نامه ها برای ایشان ارسال گردید.

سپس اطلاعات استخراج و با کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به این که نتایج مربوط به پرسش نامه ها به صورت متغیر کمی - کیفی و کیفی - کیفی می باشد، به منظور بررسی ارتباط اضطراب و متغیرهای One-way ANOVA دموگرافیک از آزمون های  $t$  و One-way analysis of variance استفاده شد.

### یافته ها

از مجموع ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۷۰ دانشجو (۹۲/۳) درصد Response rate پرسش نامه ها را تکمیل کردند. از این میان ۱۵۷ نفر پسر (۴۲/۴ درصد) و ۲۱۳ نفر دختر (۵۷/۶ درصد) بودند.

جدول ۱: رشته تخصصی دانشجویان مورد مطالعه بر اساس تقسیم بندی

در ۳ گروه داخلی، جراحی و پاراکلینیکان

رشته تحصیلی	فرآوانی	درصد
داخلی	۱۸۴	۴۹/۷
جراحی	۱۵۱	۴۰/۸
پاراکلینیکال	۳۵	۹/۵
جمع کل	۳۷۰	۱۰۰

جدول ۲: دسته بندی نمرات اضطراب دستیاران بر اساس تحلیل

Zung پرسش نامه اضطراب

رشته بندی اضطراب	فرآوانی	درصد
نرمال (عادی)	۳۴۱	۹۲/۲
اضطراب خفیف تا متوسط	۲۰	۵/۴

پرسش نامه شماره ۱ طراحی گردید که از استنادات علمی در این زمینه و نظر کارشناسان استفاده شد (۱۱).

برای سنجش اضطراب نیز از پرسش نامه خودسنجی اضطراب Zung استفاده شد. پرسش نامه Zung ابزار رایج برای ارزیابی اختلالات اضطراب در میان محققین ملیت های مختلف می باشد و در سال ۱۹۷۰ ابداع شد. بر اساس نتایج Zung توزنده جانی و همکاران، مقیاس خودسنجی اضطراب Zung ابزار مناسبی برای سنجش اضطراب می باشد؛ چرا که نتایج حاصل از مصاحبه بالینی نشان داد که در حدود ۷۵ درصد از آزمودنی هایی که با مقیاس Zung تشخیص داده شده بودند، ملاک های تشخیصی لازم برای یک اختلال اضطرابی را داشتند (۱۲). این آزمون در سنجش اضطراب گروه های مختلف به کار گرفته شده است که توسط Ojha و همکاران (به نقل از ملکیان و همکاران) در دانشجویان پزشکی به کار رفته است (۱۳). این تست توسط Zung تهیه شده، دارای ۲۰ سوال ۴ گوینده ای بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی اضطراب است. به جای پاسخ های بلی یا خیر از ستون های هیچگاه، به ندرت، گهگاه، بیشتر اوقات و دائم یا تقریبا همیشه استفاده شده است. در موقع نمره گذاری با توجه به نوع سوال اگر مثبت باشد به هیچگاه = ۱، گهگاه = ۲، بیشتر اوقات = ۳ و دائم و تقریبا همیشه = ۴ منظور می شود و اگر منفی باشد به طور عکس. حداقل مقیاس ۸۰ است و نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزش های به دست آمده از هر یک از سؤالات است و میزان اضطراب هر پاسخ گو برابر است با نمره خام تقسیم بر ۸۰ ضرب در ۱۰۰. اعتبار و پایایی مقیاس اضطراب Zung: میزان همبستگی درونی یا تجانس سؤالات نشان دهنده ضریب همبستگی برابر ۸۴ است که بیانگر پایایی بسیار بالای این مقیاس است. در این مطالعه وضعیت اضطراب هر فرد بر اساس نمره حاصل از پرسش نامه Zung مشخص شد. تعیین بدترین حالت در سلامت روانی بیشترین نمره ۸۰ و بهترین حالت کمترین نمره ۲۰ را به خود اختصاص می دهد که در حالت استاندارد به صورت زیر دسته بندی می شود (۱۴):

- میانگین نمره اضطراب دستیاران پزشکی در دانشگاه‌های مختلف مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار داشت ( $P < 0.05$ ). نتایج نشان می‌دهد که در بررسی دستیاران دانشگاه‌های اصفهان، گیلان، زاهدان، کاشان و سنترج، میانگین نمره اضطراب دستیاران دانشگاه سنترج به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمره اضطراب دستیاران در دیگر دانشگاه‌ها است.

### بحث و نتیجه‌گیری

نقاط تصمیم‌گیری مختلفی در زندگی حرفه‌ای یک دانشجوی پزشکی وجود دارد. انتخاب رشته تخصصی یکی از دشوارترین انتخاب‌های یک پزشک در زندگی حرفه‌ای خود می‌باشد و به دلیل این که می‌تواند همه جنبه‌های زندگی پزشک را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار استرس‌زا است. انتخاب بین ۴۶ رشته تخصصی و فوق تخصصی موجود در کشور و سایر انتخاب‌های ممکن مانند تخصص‌های موجود در خارج کشور و همچنین رشته‌های غیر بالینی موجود در ایران و خارج، کار دشواری است و انتخاب نامناسب پیامدهای خاص خود را دارد (۱۱، ۱۴).

یافته‌های پژوهش حاضر برای پرسش مربوط به معیار انتخاب رشته تخصصی نشان می‌دهد که ۱۶۸ نفر (۴۵/۴ درصد) به علت تنها عوامل و علایق شخصی، ۵۵ نفر (۱۴/۹ درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و ۱۴۷ نفر (۳۹/۷۴ درصد) هر دو عامل درونی و بیرونی را در انتخاب خود مؤثر دانسته‌اند. میانگین نمره اضطراب بین این ۳ گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

در بررسی اولیه نتایج، مشخص شد که ۲۹ درصد از افراد به علت تنها علاقه شخصی رشته تخصصی خود را انتخاب کردند. در مجموع رابطه معنی‌داری میان علت انتخاب رشته تخصصی و نمره اضطراب وجود نداشت. بررسی دقیق‌تر ۷ گرینه مندرج در پرسشنامه و میانگین نمره اضطراب نشان

۰/۵	۲	اضطراب آشکار تا شدید
۰	۰	اضطراب
۱۰۰	۳۷۰	جمع کل

ارتباط میانگین نمرات اضطراب با انتخاب رشته و مکان تحصیل

### عوامل مؤثر در انتخاب رشته

عوامل مؤثر در انتخاب رشته پرسشنامه در ۷ گرینه "جنبه علمی رشته، پرستیز اجتماعی، کسب درآمد بالا، توصیه نزدیکان، توصیه دوستان و آشنايان و علاقه شخصی" مورد سؤال قرار گرفت که در نهایت بر اساس پاسخ‌ها به ۳ گروه علاقه عوامل و علایق شخصی، عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و هر دو مورد، کدبندی شد. نتایج نشان می‌دهد که ۱۶۸ نفر (۴۵/۴ درصد) به علت تنها عوامل و علایق شخصی، ۵۵ نفر (۱۴/۹ درصد) به علت عوامل تأثیرگذار محیطی و خارجی و ۱۴۷ نفر (۳۹/۷۴ درصد) هر دو عامل درونی و بیرونی را در انتخاب خود مؤثر دانسته‌اند. میانگین نمره اضطراب بین این ۳ گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

### مکان تحصیل و اولویت انتخاب

- ۲۲۰ نفر (۵۹/۵ درصد) دستیاران در ۳ شهر اول مورد علاقه خود درس می‌خوانند. میانگین نمره اضطراب در دستیاران مورد مطالعه با میانگین پاسخ‌های داده شده به سؤال "آیا در ۳ شهر اول مورد علاقه خود پذیرفته شده‌اید؟" رابطه منفی دارد، در واقع میانگین نمره اضطراب دستیارانی که به این سؤال پاسخ بلی داده‌اند، کمتر است و این اختلاف معنی‌دار است ( $P < 0.05$ ).

- پاسخ دستیاران به پرسش آیا در حال حاضر در رشته‌ای تحصیل می‌کنند که اولویت شما در انتخاب بوده است؟ توسط ۲۴۴ نفر (۶۵/۹ درصد) بلی و ۱۲۶ نفر (۳۴/۱ درصد) خیر بود. میانگین نمره اضطراب در دستیاران مورد مطالعه با میانگین پاسخ‌های داده شده به سؤال مذکور رابطه منفی دارد. در واقع میانگین نمره اضطراب دستیارانی که به این سؤال پاسخ بلی داده‌اند، کمتر است، ولی این اختلاف معنی‌دار نیست.

را مطرح می‌سازد که بالا بودن میزان اضطراب و افسردگی در خوابگاهها تنها محصول دوری از خانواده نباشد (۸).

در مطالعه انجام شده توسط شهیدزاده و همکاران شایع‌ترین مسایل و مشکلات محیط کاری و درسی که توسط دانشجویان در این تحقیق عنوان شده‌اند، عبارتند از تعداد زیاد دانشجو/ کمبود امکانات و فضاهای آموزشی/ عدم دخالت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دانشجویان/ فاصله زیاد بین منزل (خوابگاه) و دانشگاه (بیمارستان محل تحصیل)/ فشار زیاد کاری/ مسایل و کمبودهای محیط خوابگاهی یا منزل/ رفتار بد و عدم احترام از طرف کارمندان دانشگاه/ بدرفتاری از طرف استادان دانشگاه/ مشغله زیاد در بیرون از محیط دانشگاه (۱۵). همان گونه که مشاهده می‌کنید، در مطالعه شهیدزاده و همکاران نیز از ۹ مورد مشکل دانشجویان، ۵ مورد مربوط به مکان تحصیل است. نتایج بررسی دادخواه و همکاران نشان داد که دانشجویان بومی نسبت به دانشجویان غیر بومی از سلامت روانی بهتری برخوردارند. پذیرش در دانشگاه برای دانشجویان بومی با دوری از خانواده، دوستان و آشنايان همراه است و متضمن سازگاری مجدد با تغییرات حاصله در زندگی جدید است (۱۶). نتایج مطالعه ذوالفاری و آکوچکیان نیز نشان می‌دهد که از همه عوامل بررسی شده، تنها جنس و محل سکونت با اضطراب معنی‌دار است (۱۷). نتایج مؤید این است که دستیاران باید علاوه بر توجه به رشته تحصصی از محل تحصیل و روحیات خود بیشتر تحقیق نمایند تا درگیر مشکلات و فشارهای روانی در حین تحصیل نشوند. بسیاری از دستیاران با نداشتن علم کافی نسبت به قوانین جابجایی تنها به رشته مورد نظرشان فکر می‌کنند. این در حالی است که به علت از دیاد دستیاران روز به روز قوانین سخت‌تری وضع می‌گردد، به طور مثال در خبرها می‌خوانیم: جابجایی در دوره دستیاری منوع است. دکتر ضیایی (مشاور وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت)، در این رابطه گفت، به پذیرفته شدگان پیشنهاد می‌شود که در فکر انتقال نباشند و اگر در محیط دانشگاه‌ها نیز آگهی‌هایی پخش می‌شود،

می‌دهد: دستیارانی که پرستیز اجتماعی، درآمد و علاقه شخصی را یکی از علل انتخاب رشته تحصصی خود دانسته‌اند، میانگین اضطراب کمتری دارند و دستیارانی که جنبه علمی رشته، توصیه دولت و نزدیکان را یکی از علل انتخاب رشته تحصصی خود دانسته‌اند، میانگین اضطراب بیشتری دارند، ولی هیچ یک از این تفاوت‌ها در سطح ۰/۰۱ معنی‌دار نبود.

در مقایسه با مطالعات مشابه، نتایج مطالعه انجام شده توسط ملکی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از دانشجویان علاقه به ادامه تحصیل را مهم‌ترین علت ورود به دانشگاه ذکر کرده‌اند و ۲۱/۸ درصد اصرار خانواده و دوستان و یا نداشتن راهی جز ادامه تحصیل را مطرح کرده‌اند (۸).

همان گونه که نتایج نشان داد، بیش از ۶۰ درصد از دستیاران مورد مطالعه اظهار داشته‌اند که در یکی از ۳ شهر اول مورد علاقه خود درس می‌خوانند که تفاوت آن رابطه معنی‌داری با اضطراب در دستیاران داشته است. به عبارت دیگر عدم علاقه به مکان تحصیل، باعث بالا رفتن نمره اضطراب دستیاران شده است. این نکته از لحاظ مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. نتایج تحقیق انجام شده به منظور "بررسی عوامل مؤثر بر میزان اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان" نشان می‌دهد که میانگین نمرات اضطراب و افسردگی دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها در مقایسه با دانشجویانی که نزد خانواده خود یا جدا از خانواده در منازل استیجاری زندگی می‌کنند، به میزان قابل توجهی بالاتر است و این اختلاف در هر دو آزمون اضطراب و افسردگی معنی‌دار است. ملکی و همکاران در این زمینه می‌گویند که محل سکونت درصد قابل توجهی از دانشجویان به ناچار خوابگاه‌ها می‌باشد، به دلیل افزایش موارد اضطراب و افسردگی در این گروه از دانشجویان نکته حائز اهمیتی است. این افزایش ممکن است که حاصل دوری از خانواده یا محیط نامناسب خوابگاه‌ها باشد. پایین بودن میزان این اختلالات در دانشجویانی که بدور از خانواده و در منازل استیجاری زندگی می‌کنند، این احتمال

صورت معنی‌داری متفاوت است. رتبه‌بندی سطح اضطراب رشته‌های مختلف از بیشتر به کمتر به صورت زیر اعلام گردید: علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، مبارزه با بیماری‌ها، مامایی، فوریت‌های پزشکی، بهداشت حرفه‌ای، بهداشت خانواده، پزشکی، بهداشت محیط و پرستاری.

همان گونه که مشاهده می‌کنید، سطح اضطراب در دانشجویان پزشکی دانشگاه کردستان نسبت به رشته‌های دیگر در سطح مطلوبی قرار دارد و از ۱۱ رشته مورد بررسی دارای رتبه ۹ می‌باشد. این مطالعه نمی‌تواند نتایج کاملی برای مقایسه با مطالعه حاضر ارایه دهد، زیرا اول این که سطح اضطراب امتحان مورد بررسی بوده، دوم دانشجویان تحصیلات تكمیلی از جمله دستیاران پزشکی وارد مطالعه نشده‌اند (۱۹).

#### نتیجه‌گیری

با نگاهی به عوامل بالا می‌توان گفت که علاقه و موفقیت هر چه بیشتر دستیاران در تحصیل، ثمره انتخاب درست ایشان، همچنین برنامه‌ریزی‌های مدیریتی برای از بین بردن موانع انتخاب رشته و شهر مورد علاقه از طرف مسئولان و برنامه‌ریزان می‌باشد. آگاهی از جنبه‌های مختلف رشته‌های تخصصی و مطابقت آنها با ویژگی‌های شغلی دلخواه و توانایی‌های فرد، امکان انتخابی مناسب را فراهم می‌سازد، ولی متأسفانه در سیستم آموزش پزشکی ما برنامه خاصی برای معرفی تخصص‌های مختلف و شرایط هر دانشگاه وجود ندارد و تصویر هر رشته بر اساس حضور در بخش‌های مختلف بیمارستانی (آشنایی با استادان و بیماران آنها) و اطلاعات کلی از جامعه، در متضایان شکل می‌گیرد که تصویر دقیقی از رشته و محل تحصیل نمی‌باشد.

#### محدودیت‌ها

تشخیص اختلالات روان‌پزشکی از جمله اضطراب بهتر است که بر اساس انجام مصاحبه‌های بالینی صورت پذیرد که امکان انجام چنین کاری با روش کار تحقیق حاضر یعنی شرکت دادن ۴۰۰ دستیار در ۵ شهر مختلف، تا حدودی غیر

دانشگاه‌ها باید به عنوان یک تخلف با آن برخورد کنند و حساس بوده، اجازه ندهند که این جو ایجاد شود. دستیار با دانشجو متفاوت است و شرایط انتقال ندارد.

البته برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه در حال انجام است و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: با توجه به تغییرات آزمون دستیاری در سال ۱۳۹۱، تغییراتی در زمینه انتخاب رشته صورت می‌گیرد، که از آن جمله امکان انتخاب رشته محل در ۵ رشته محل محدود می‌شود و با توجه به تغییر ضریب‌های دروس امتحانی، امکان انتخاب رشته بر حسب علاقمندی افزایش می‌یابد.

این پژوهش بر دستیاران پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، گیلان، زاهدان، کاشان و سنترج انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میانگین نمره اضطراب دستیاران دانشگاه سنترج به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمره اضطراب دستیاران در دیگر دانشگاه‌ها است. تفاوت مذکور از چند نظر قابل بررسی است: توزیع بالای دستیاران غیر بومی در دانشگاه علوم پزشکی سنترج از طرفی ۸۰ درصد از دستیاران در این مطالعه در رشته بیماری‌های داخلی تحصیل می‌کنند که در گروه علاقه‌مندی پایین قرار دارند. همچنین وجود فرهنگ خاص در منطقه کردستان که این فرهنگ و مذهب سنی بالای این منطقه، باعث می‌شود تا دانشجویان غیر بومی در اقلیت مذهبی قرار بگیرند. نتایج یک مطالعه خارجی نشان می‌دهد که سطح فشار عصبی در دانشجویان متعلق به اقلیت‌های قومی و نژادی به مراتب بیشتر از سایر دانشجویان بوده است. منشأ این نقش علاوه بر مسایلی همچون تبعیض و رفتارهای نژادپرستانه، تا حد زیادی مربوط به انزوای اجتماعی حاصل از قرار گرفتن در محیطی ناآشنا با روابط دوستی خانوادگی محدود است (۱۸). به منظور بررسی سطح اضطراب در دانشگاه‌های مختلف مطالعه‌ای یافت نشد. نتایج مطالعه‌ای در زمینه سطح اضطراب امتحان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان می‌دهد که میانگین سطح اضطراب در رشته‌های تحصیلی مختلف به

حاضر اکثریت دستیاران به پرسش در این زمینه پاسخ صحیح نداده‌اند که یکی دیگر از محدودیت‌های این مطالعه بود.

## References:

- Wells A. Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: A Division of Guilford Publication; 2009.
- Rezaei Aderiani M, Azadi A, Ahmadi A, Vahedian Azimi A. Comparison of depression, anxiety, stress and quality of life in dormitories students of Tarbiat Modares University. Iranian Journal of Nursing Research. 2007; 2(4): 31-8. [In Persian]
- Maroufi M. Survey of relative frequency depression symptoms in medical students and graduate physicians. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2004; 1(1): 1-4. [In Persian].
- Mokhtaripour M, Goodarzi Z, Siadat A, Keivanara M. Anxiety, Depression and some of their Demographic Correlates in Students of Isfahan Medical University. Journal of Research in Behavioral Sciences. 2007; 5(2): 107-12 [In Persian].
- Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Wolters Kluwer Health. 9 th ed. 2003.
- Halonen G.S, Santrock JW: Psychology (context and Application).Third Edition Mcgaw Hill CO. New York, America.1999 . کتاب
- Najafi pour S, Yektatalab Sh. The prevalence of depression among the students of Jahrom university of medical sciences and its relationship with academic failure. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2009;6(2):27-37 [In Persian].
- Maleki H, Motaghipoor Y, Sadeghifar M. [A study on depression and anxiety related factors in Hamedan Medical Sciences University students]. Tehran University Medical Journal. 1997; 55(6): 79-85 [In Persian].
- Inam SN, Saqib A, Alam E. Prevalence of anxiety and depression among medical students of private university. Journal of Pakistan Medical Association. 2003; 53(2):44-7.
- Stress in during resident effect to pathology residents successful performance and number of medical errors. 2010. Available from:URL:<http://www.pezeshk.us/?p=10380> [In Persian]
- Hadarag A, Nikzad M, Samei F. Selection guide of medical specialty. Tehran: Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2004 [In Persian]. کتاب
- Toozande Jani H, Barahani MT, Abaolahian E. [The comparison efficiency of education of anxiety control, and pharmacotherapy their combination in patients generalized anxiety disorder treatment]. [dissertation]. Tehran: Tehran Psychiatric Institute; 1993. [In Persian] پایان نامه
- Malekian A, Alizadeh A, Ahmadzadeh GH. Anxiety and Depression in Cancer Patients. Journal of Research in Behavioral Sciences. 2007; 5(2): 115-8. [In Persian]
- Hadarag A, Yusefy AR, Sabouri M, Richard G. Psychometric properties of a Persian version of the specialty indecision scale: A preliminary study. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 8(2): 229-37. [In Persian]
- Shahidzade A, Azin A, Ebadi M, Omidvari Sh, et al Garmaroodi GhR. Stress in medical students: a cross-sectional study. Payesh. 2010; 9(1): 5-12. [In Persian]
- Dadkhah B, Mohammadi MA, Mozafari N. Mental Health Status of the Students in Ardabil University of Medical Sciences, 2004. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2006; 6(1): 31-6. [In Persian]
- Zolfaghari H, Akoochakian Sh. [Survey of frequency anxiety in medical students in Esfahan university of medical sciences in 2000]. [dissertation]. Esfahan: Esfahan University of Medical Sciences; 2000. [In Persian] پایان نامه
- Armstead C, et al. Relationship of racial stressors to blood pressure responses and anger expression in black college students. Health Psychology. 1989; 8(5):541-56.

ممکن بود و انجام این مطالعه می‌تواند شروعی برای مطالعات دقیق‌تر در این زمینه باشد. همچنین اطلاعات غیر رسمی در زمینه اضطراب دستیاران حاکی از آن است که تعداد زیادی از ایشان داروهای ضد اضطراب مصرف می‌کنند که در تحقیق

19. Hatami Z, Ardalan M. Assessment of the level of test anxiety in the students of the Kurdistan University of Medical Sciences & its related factors. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2010; 14(4): 99-105. [In Persian]

## The Role of Medical Residents' Anxiety in Selecting Their Specialty Field and Place of Study

**Fariborz Khoshrvash<sup>1</sup>, Sahar Vesal<sup>2\*</sup>, Seyed Ali Mousavi<sup>1</sup>, Gholam Reza Ghasemi<sup>3</sup>, Noshin Mehrbod<sup>4</sup>**

1. Neurologist, Associate Professor of Neurology Dept., Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

2. Researcher, B.Sc. in Health Service Management, Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

3. PhD of Mental Health, Associate Professor of Psychiatry Dept., Medical Education Research Centre (MERC), Isfahan University of Medical Sciences, Iran

4. Resident of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

• Received: 4 Dec, 2011

• Received Corrected Version: 15 Jan, 2012

• Accepted: 21 Jun, 2012

**Background & Objectives:** Selection of specialty field to continue education is such a great challenge for general physicians that can create stress in their personal life. The purpose of this study was to determine the relationship between the rate of anxiety in medical residents and their desired criteria in selecting specialty field and place of study.

**Methods:** This descriptive and cross-sectional study was performed on a total of 370 medical residents selected through stratified sampling from Isfahan, Guilan, Zahedan, Sanandaj and Kashan Universities of Medical Sciences, Iran. Data were collected through demographic features questionnaire and Zung anxiety self-evaluation questionnaire..

**Results:** More than 92% of residents did not have anxiety and were in normal condition. From all, 168 (45.4%) had selected their specialty field based on just their personal interests, 55 (14.9%) based on external factors, and 147 (39.74%) based on both internal and external factors. In regard to the place of study, 220 residents (59.5%) were studying in their first three preferred cities and there was a significant relationship between anxiety and place of education ( $P < 0.05$ ).

**Conclusion:** Since academic satisfaction and success of medical residents is highly dependent on studying in their favorite specialty field and place, administrative programming by officials and planners is highly required for omitting barriers in selecting field and place of education.

**Key Words:** Anxiety, Medical assistants, Course selection, Place of education

\*Correspondence: Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Hezar Jarib St, Isfahan, Iran

• Tel: (+98) 913200 2210

• Fax: (+98) 771 455 0187

• Email: vesal.sahar@yahoo.com